

Anwendung

Novalac AC ist eine speziell auf die Ernährungsbedürfnisse des Babys bei Bauchschmerzen, Blähungen und Blähungen aufgrund von Laktoseintoleranz abgestimmte Formel. Novalac AC ist für Säuglinge und Kleinkinder von der Geburt bis zum 36. Lebensmonat geeignet, wenn nicht gestillt wird. Novalac AC kann als einzige Nahrungsquelle verwendet werden, bis der Säugling 6 Monate alt ist. Über 6 Monate hinaus kann Novalac AC nach ärztlicher Empfehlung als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung eingesetzt werden. Novalac AC hat einen reduzierten Laktosegehalt, um die kolikartige Fermentation bzw. das Auftreten von Bauchschmerzen und Blähungen zu begrenzen.

Wichtige Hinweise

Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Bitte nehmen Sie Novalac AC nur unter ärztlicher Kontrolle bei Säuglingen mit Symptomen. Das Produkt sollte nicht als alleinige Nahrungsquelle nach dem Alter von 6 Monaten verwendet werden und/oder im Falle einer Galaktosämie. Besondere Aufmerksamkeit ist notwendig bei Kuhmilcheiweißallergie, bei Frühgeborenen, bei Neugeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht oder geschwächtem Immunsystem. Unsachgemäße Zubereitung oder Lagerung kann ein Gesundheitsrisiko darstellen. Novalac AC ist nicht für parenterale Anwendung geeignet. Novalac AC ist nicht geeignet für Sondernahrung. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Dosierung

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Alter (Monate) | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-12 | 12-36 |
| Anzahl der Mahlzeiten pro Tag | 6 | 5 | 5 | 4 | 3* | 2* |
| Anzahl der Messlöffel pro Mahlzeit | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Wasseranteil (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |

** als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung

Ein gestrichener Messlöffel der beigelegt ist, enthält 4,3 g Novalac. Lösen Sie einen Messlöffel in 30 ml Wasser auf. Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt oder Apotheker sollen Menge und Anzahl aller Tagesmahlzeiten an die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Wenn der Kinderarzt Ihnen nichts anderes empfiehlt, befolgen Sie die Empfehlungen in der Tabelle.

- Immer eine frische Mahlzeit zubereiten.
- Vor Wärme und Licht schützen, an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Nach Öffnen der Dose Inhalt innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut verschließen.
- Reste der Mahlzeit nicht aufbewahren, sondern entsorgen.
- Mindestens haltbar bis: siehe Boden.

15E0S19A

3626394



0-36 Monate

Novalac

AC

Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke
(bilanzierte Diät)

Zum Diätmanagement bei
Bauchschmerzen, Gas
und Blähungen

Reduzierter Laktosegehalt



400 g e

Durchschnittliche Zusammensetzung

| | 100 g | 100 ml |
|-------------------------------|-------|--------|
| Energie | | |
| kJ | 2095 | 272 |
| kcal | 500 | 65 |
| Fett | | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 25 | 3,3 |
| - Linolsäure | 10,5 | 1,4 |
| - Alpha-Linolensäure | 4,5 | 0,6 |
| - DHA (Docosahexaensäure) | 405 | 53 |
| - ARA (Arachidonsäure) | 30 | 4 |
| Kohlenhydrate | | |
| - davon Zucker | 57,5 | 7,5 |
| Laktose | 22 | 2,9 |
| GOS (Galacto-Oligosaccharide) | 18 | 2,3 |
| Ballaststoffe | | |
| Eiweiß | 1,2 | 0,2 |
| Salz | 10,4 | 1,4 |
| Vitamine | 0,475 | 0,06 |
| A | 440 | 57 |
| D | 12 | 1,6 |
| E | mg | 11 |
| K | mg | 70 |
| C | mg | 9,1 |
| Thiamin | mg | 0,9 |
| Riboflavin | mg | 1,2 |
| Niacin | mg | 5 |
| B6 | mg | 0,5 |
| Folsäure | µg | 0,07 |
| Folat | 85 | 11 |
| B12 | µg | 150 |
| Biotin | µg | 20 |
| Pantothenäure | µg | 1,6 |
| Mineralstoffe | | |
| Natrium | mg | 25 |
| Kalium | mg | 590 |
| Chlorid | mg | 400 |
| Kalzium | mg | 65 |
| Phosphor | mg | 310 |
| Magnesium | mg | 40 |
| Eisen | mg | 5,2 |
| Zink | mg | 0,7 |
| Kupfer | mg | 3,5 |
| Mangan | mg | 0,38 |
| Fluorid | mg | 0,05 |
| Selen | µg | 0,035 |
| Chrom | µg | 0,005 |
| Molybdän | µg | <0,45 |
| Jod | µg | <0,06 |
| Cholin | mg | 26 |
| Inositol | mg | 45 |
| Taurin | mg | <45 |
| L-Carnitin | mg | <5,9 |
| | 95 | 12 |
| | 170 | 22 |
| | 80 | 10,4 |
| | 40 | 5,2 |
| | 20 | 2,6 |

Zutaten

Magermilch, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokosnuss, Raps), Galacto-Oligosaccharide (Milch), Laktose, Fischöl (DHA), Tricalciumcitrat, Cholinbitartrat, Emulgator (Soja-Lecithin), Trikaliumcitrat, Dinatriumphosphat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothenäure, B1, B2, A, B6, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Natriumchlorid, Trimagnesiumcitrat, Eisendiphosphat, Inositol, L-Cystin, L-Tryptophan, Milchkulturen (L. lactis, L. rhamnosus), Kaliumchlorid, Taurin, Öl aus *Mortierella alpina* (ARA), Calciumhydroxid, Dikaliumphosphat, L-Carnitin, Magnesiumchlorid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Stark toceroholatherale Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natrumselenit, Kaliumjodid, Kupfersulfat, Mangansulfat.

Zubereitung

VOR DER ZUBEREITUNG
GRÜNDLICH HÄNDE
WASCHEN.

1 Flasche und Schnüller
reinigen und 5 Minuten lang
in kochendem Wasser
sterilisieren.

2 Frisches Leitungswasser
5 Minuten lang abkochen.

3 Wasser auf 40 °C abkühlen
und in die Flasche
eingießen.

4 Die erforderliche Anzahl an
Messlöffeln hinzufügen.

5 Babyflasche mit
Kunststoffdeckel schließen
und schütteln, bis das Pulver
im Wasser vollständig
aufgelöst ist.

6 Temperatur (37 °C) an der
Innenseite des Handgelenks
überprüfen.