

DURCHSCHNITTLICHE ZUSAMMENSETZUNG

	100 g	100 ml
Energie	kJ 2106	284
	kcal 504	68
Fett	g 26,2	3,5
- davon gesättigte Fettsäuren	g 10,2	1,4
- Linolsäure	g 4,7	0,6
- Alpha-Linolensäure	mg 430	58
- DHA (Docosahexaensäure)	mg 120	16
- ARA (Arachidonsäure)	mg 30	4
Kohlenhydrate	g 53,5	7,2
- davon Zucker	g 4,7	0,6
- davon Stärke	g 1	0,1
Ballaststoffe	g 2	0,3
Eiweiß	g 12,1	1,6
Salz	g 0,45	0,06
Vitamine		
A	µg 440	59
D	µg 12	1,6
E	mg 8,7	1,2
K	µg 30	4,1
C	mg 60	8,1
Thiamin	mg 0,8	0,11
Riboflavin	mg 1,2	0,2
Niacin	mg 4,5	0,6
B6	mg 0,6	0,08
Folsäure	µg 100	14
Folat	µg-DFE 170	23
B12	µg 1,5	0,2
Biotin	µg 15	2
Pantothenäure	mg 5	0,7
Mineralstoffe		
Natrium	mg 180	24
Kalium	mg 610	82
Chlорид	mg 400	54
Kalzium	mg 575	78
Phosphor	mg 330	45
Magnesium	mg 50	6,8
Eisen	mg 5,4	0,7
Zink	mg 3,5	0,5
Kupfer	mg 0,38	0,05
Mangan	mg 0,05	0,007
Fluorid	mg <0,45	<0,06
Selen	µg 22	3
Chrom	µg <45	<6,1
Molybdän	µg <45	<6,1
Jod	µg 100	14
Cholin	mg 170	23
Inositol	mg 25	3,4
Taurin	mg 40	5,4
L-Carnitin	mg 20	2,7

ZUBEREITUNG**VOR DER ZUBEREITUNG
GRÜNDLICH HÄNDE
WASCHEN.**

- Flasche und Schnuller reinigen und 10 Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren.
- Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen.
- Wasser auf 45 °C abkühlen und in die Flasche eingleien.
- Die erforderliche Anzahl an Messlöffeln hinzufügen.
- Babyflasche mit Kunststoffdeckel schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
- Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen.

Novalac Allernova AR ist eine eingedickte Nahrung und sollte so lange geschüttelt werden bis das Pulver aufgelöst ist. Aufgrund der besonderen Zusammensetzung von Novalac Allernova AR können im Vergleich zu Standardnahrungen Abweichungen in Konsistenz, Geruch und Geschmack auftreten. Es kann auch zu einem weniger festen und/oder grünlichen Stuhl kommen, ohne dass dabei die Gesundheit Ihres Babys beeinträchtigt wird.

200008724



Novalac

Allernova AR



**Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke
(bilanzierte Diät)**

**Zum Diätmanagement bei
Kuhmilchproteinallergie
und Regurgitation**

Laktosefrei



0-36 Monate

400 g

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Anzahl der Mahlzeiten pro Tag	6	5	5	4	3*	2*-3*
Anzahl der Messlöffel pro Mahlzeit	3	4	5	7	7	8
Wasseranteil (ml)	90	120	150	210	210	240

* als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung

Ein gestrichener Messlöffel der beigelegt ist, enthält 4,5 g Novalac. Lösen Sie einen Messlöffel in 30 ml Wasser auf. Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt oder Apotheker sollen Menge und Anzahl aller Tagesmahlzeiten an die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Wenn der Kinderarzt Ihnen nichts anderes empfiehlt, befolgen Sie die Empfehlungen in der Tabelle.

Immer eine frische Mahlzeit zubereiten. Vor Wärme und Licht schützen, an einem trockenen Ort aufbewahren. Nach Öffnen der Dose Inhalt innerhalb von 3 Wochen verbrauchen. Dose nach Gebrauch gut verschließen. Reste der Mahlzeit nicht aufbewahren, sondern entsorgen. Mindestens haltbar bis: siehe Boden.

ZUTÄTEN

Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm, Raps, Sonnenblumen, Kokosnuss), hydrolysierte Milchproteine, Verdickungsmittel (Pektin, Xanthan gummi, Johanniskreuzgummi), Tapiokastärke, Dicalciumphosphat, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Tricalciumcitrat, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (DHA), L-Cystin, Vitamine (C, E, B5,B3, B2, B1, B6, A, Folsäure, K1, B7,D3, B12), L-Tryptophan, Eisendiphosphat, Öl aus Mortierella alpina (ARA), Dikaliumphosphat, Trikaliumcitrat, Trinatriumcitrat, Taurin, L-Histidin, Inositol, L-Phenylalanin, L-Carnitin, L-Tyrosin, L-Isoleucin, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat.

ANWENDUNG

Novalac Allernova AR ist eine angedickte Nahrung aus hydrolysierten Kuhmilchproteinen (Kasein). Es wurde speziell für die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen bei einer Allergie gegen Kuhmilchproteine, mit oder ohne Regurgitationen, entwickelt. Novalac Allernova AR enthält eine einzigartige patentierte Verdickungsmischung, die die Eigenschaften von Stärke und Ballaststoffen kombiniert. Novalac Allernova AR ist für nicht gestillte Säuglinge und Kleinkinder von der Geburt bis zum 36. Lebensmonat geeignet. Novalac Allernova AR kann als einzige Nahrungsquelle verwendet werden, bis der Säugling 6 Monate alt ist. Über 6 Monate hinaus kann Novalac Allernova AR nach ärztlicher Empfehlung als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung eingesetzt werden. Führen Sie keine milcheiweißhaltigen Produkte (Säuglingsbrei mit Milch, Milchprodukte usw.) in die Ernährung Ihres Babys ein, ohne vorher ärztlichen Rat einzuholen. Novalac Allernova AR enthält kein Gluten und ist komplett laktosefrei.

WICHTIGE HINWEISE

Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Bitte nehmen Sie Novalac Allernova AR nur unter ärztlicher Kontrolle bei Säuglingen mit Symptomen. Das Produkt sollte nicht als alleinige Nahrungsquelle nach dem Alter von 6 Monaten verwendet werden. Novalac Allernova AR sollte nicht bei Glukose-Galaktose-Malabsorption gegeben werden. Besondere Aufmerksamkeit ist notwendig bei Frühgeborenen, bei Neugeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht oder geschwächtem Immunsystem. Unsachgemäße Zubereitung oder Lagerung kann ein Gesundheitsrisiko darstellen. Novalac Allernova AR ist nicht für parenterale Anwendung geeignet. Novalac Allernova AR ist nicht als Sondenernährung geeignet. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Hauptsitz: UP Medi-Europa SA, Schweiz
Vertreter: Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, A-2345 Brunn am Gebirge
Hergestellt in der EU.