

Anwendung

Novalac AR Digest + ist eine speziell angepasste Milchnahrung, die auf die Ernährungsbedürfnisse von Babys mit Regurgitation abgestimmt ist. Novalac AR Digest + ist für Säuglinge und Kleinkinder von der Geburt bis zum 36. Lebensmonat geeignet, wenn nicht gestillt wird. Novalac AR Digest + kann als einzige Nahrungssorte verwendet werden, bis der Säugling 6 Monate alt ist. Über 6 Monate hinaus kann Novalac AR Digest + nach ärztlicher Empfehlung als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung eingesetzt werden. Novalac AR Digest + ist eine angeleidete Milchnahrung, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen mit Regurgitationen und gastroösophagealen Refluxbeschwerden abgestimmt ist. Novalac AR Digest + enthält ein innovatives Andikungsmittel, das die Eigenschaften von Stärke und Ballaststoffen kombiniert, um das Aufstoßen zu minimieren.

Wichtige Hinweise

Stellen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Bitte wenden Sie Novalac AR Digest + nur unter ärztlicher Kontrolle bei Säuglingen mit Symptomen an, für die diese Milchnahrung bestimmt ist. Das Produkt sollte nicht als alleinige Nahrungssource nach dem Alter von 6 Monaten verwendet werden. Besondere Aufmerksamkeit ist notwendig bei Kuhmilcheiweißallergie, bei Frühgebornen, bei Neugeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht oder geschwächtem Immunsystem. Unsachgemäße Zubereitung oder Lagerung kann ein Gesundheitsrisiko darstellen. Novalac AR Digest + ist nicht für parentrale Anwendung geeignet. Novalac AR Digest + ist nicht geeignet für Sonderernährung.

Dosierung

Alter (Monate)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Anzahl der Mahlzeiten pro Tag	6	5	5	4	3*	2*-3*
Anzahl der Messlöffel pro Mahlzeit	3	4	5	7	7	8
Wasseranteil (ml)	90	120	150	210	210	240

* als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung

Ein gestrichener Messlöffel der beigelegt ist, enthält 4,3 g Novalac AR Digest +. Lösen Sie einen Messlöffel in 30 ml Wasser auf. Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt oder Apotheker sollen Menge und Anzahl aller Tagesmahlzeiten an die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Wenn der Kinderarzt Ihnen nichts anderes empfiehlt, befolgen Sie die Empfehlungen in der Tabelle.

Aufgrund der spezifischen Zusammensetzung müssen Sie möglicherweise mehr und länger schütteln, um das Milchpulver in der Flasche aufzulösen. Des Weiteren kann das Milchpulver von Novalac AR Digest + einige kleine dunkle Partikel pflanzlichen Ursprungs (Hagebuttenmehl) und/oder weiße Aggregate aus Ballaststoffen enthalten, was aber keine Konsequenzen für Ihr Kind hat.

- Immer eine frische Mahlzeit zubereiten.
- Vor Wärme und Licht schützen, an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Nach Öffnen der Dose Inhalt innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut verschließen.
- Reste der Mahlzeit nicht aufbewahren, sondern entsorgen.
- Mindestens haltbar bis: siehe Boden.

Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Hauptsitz: UP Medi-Europa SA, Schweiz

Vertreter: Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, A-2345 Brunn am Gebirge

 MEDIS | www.novalac.at

200149100



3 831061 015262

Novalac AR Digest +



0-36 Monate

400 g e



Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Zum Diätmanagement bei
Regurgitation

Durchschnittliche Zusammensetzung

	100 g	100 ml
Energie	kJ 2097	273
	kcal 501	65
Fett	g 25,1	3,3
- davon gesättigte Fettsäuren	g 11,2	1,5
- Linolsäure	g 4,5	0,6
- Alpha-Linolensäure	mg 405	53
- DHA (Docosahexaensäure)	mg 120	16
- ARA (Arachidonsäure)	mg 30	4
Kohlenhydrate	g 57,2	7,4
- davon Zucker	g 30,3	3,9
- davon Stärke	g 1	0,1
Ballaststoffe	g 1,9	0,2
Eiweiß	g 10,4	1,4
Salz	g 0,475	0,06
Vitamine		
A	µg 425	55
D	µg 11,5	1,5
F	mg 8,7	1,1
K	µg 60	7,8
C	mg 65	8,5
Thiamin	mg 0,8	0,10
Riboflavin	mg 1,2	0,2
Niacin	mg 4,5	0,6
B6	mg 0,5	0,07
Folsäure	µg 85	11
Folat	µg-DFE 155	20
B12	µg 1,5	0,2
Biotin	µg 18	2,3
Pantothenäsure	mg 4,9	0,6
Mineralstoffe		
Natrium	mg 190	25
Kalium	mg 590	77
Chlорид	mg 445	58
Kalzium	mg 525	68
Phosphor	mg 335	44
Magnesium	mg 53	6,9
Eisen	mg 5,3	0,7
Zink	mg 4	0,5
Kupfer	mg 0,38	0,05
Mangan	mg 0,041	0,005
Fluorid	mg <0,45	<0,06
Selen	µg 22	2,9
Chrom	µg <45	<5,9
Molybdän	µg <45	<5,9
Jod	µg 95	12
Cholin	mg 170	22
Inositol	mg 80	10,4
Taurin	mg 40	5,2
L-Carnitin	mg 20	2,6

Zutaten

Magermilch, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokosnuss), **Laktose**, Verdickungsmittel (Pektin, Johanniskernmehl), Tapiokastärke, **Fischöl** (DHA) (**Milch**), Emulgator (**Soja**-Lecithin), Tricalciumcitrat, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B1, B2, A, B6, Folsäure, K, Biotin, D, B12), L-Cystin, Inositol, Öl aus Mortierella alpina (**ARA**) (**Milch**), Dikaliumphosphat, L-Tryptophan, Taurin, Trinatriumcitrat, Dinatriumphosphat, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Trimagnesiumcitrat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat.

Zubereitung

VOR DER ZUBEREITUNG GRÜNDLICH HÄNDE WASCHEN.

Flasche und Schnuller reinigen und 5 Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren.

1 Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen.

2 Wasser auf 40 °C abkühlen und in die Flasche eingleien.

3 Die erforderliche Anzahl an Messlöffeln hinzufügen.

4 Babyflasche mit Kunststoffdeckel schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.

5 Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen.